

¿Cómo usar Masivet®?



Presentación

Comprimidos naranjas, redondeados, recubiertos.

2 presentaciones: 50 mg y 150 mg, en frascos de 30 comprimidos.

Administración

Via oral.

No se necesitan guantes.

Los comprimidos deben administrarse enteros. No se pueden dividir, romper o pulverizar.

A diferencia de la quimioterapia, Masivet® es normalmente bien tolerado.

Las reacciones adversas más frecuentes son:

- Diarrea y vómitos. Normalmente están relacionados con la presencia del tumor más que con el tratamiento con Masivet® y se controlan bien

administrando antihistamínicos anti H2.

- Pérdida de apetito, astenia, edema periférico y alopecia (entre 3-10 % de los perros tratados)

- Anemia moderada, anemia hemolítica e incremento de la ALT (2-3 % de los perros tratados)

- Síndrome de pérdida de proteínas (causado principalmente por una disminución de la albúmina sérica).

Durante los primeros 2-3 meses la albuminemia debe ser controlada cada 15 días. El tratamiento debe suspenderse si los niveles de albúmina descienden por debajo de 20 g/l.

Los perros deben ser monitorizados para determinar la necesidad de reducir la dosis de Masivet® en caso de que aparezcan efectos secundarios.

Tabla de dosificación

12.5 mg/kg peso vivo	Dosis diaria en comprimidos		Dosis diaria en mg/kg	
	50 mg	150 mg	Peso más bajo	Peso más alto
>3-6	1		16.7	8.3
>6-10	2		16.7	10
>10-15		1	15	10
>15-18	1	más 1	13.7	11.1
>18-22	2	más 1	13.9	11.4
>22-26		2	13.6	11.5
>26-30	1	más 2	13.5	11.7
>30-34	2	más 2	13.3	11.8
>34-38		3	13.2	11.8
>38-42	1	más 3	13.2	11.9
>42-46	2	más 3	13.1	12
>46-50		4	13	12
>50-54	1	más 4	13	12
>54-58	2	más 4	13	12.1
>58-62		5	12.9	12.1
>62-66	1	más 5	12.9	12.1
>66-70	2	más 5	12.9	12.1
>70-74		6	12.9	12.2
>74-78	1	más 6	12.8	12.2
>78	2	más 6	12.8	